

カルシウム高含有！欠乏対策に効果的

特殊肥料

葉 面 散 布

スイカル®

有機酸カルシウム(CaO)42.0%以上



1kg×20袋 箱詰
5kg×4袋 箱詰

果樹版
チラシ

- カルシウムの含有量が高く、効率的かつ経済的！
- 無色透明に溶け、作物を汚しません。
- 溶けがよく、吸収のよい有機酸カルシウムを使用。

使用倍率：葉面散布500～1000倍

(肥料登録の為、作物・倍数・回数の制限はありません)

対象作物	散布目的	散布時期
リンゴ	ビターピット 油上がり・軟化軽減	落花直後より3～5回
カンキツ	果皮強化・貯蔵性向上	開花後より収穫まで定期的3～5回
ブドウ	徒長抑制・脱粒軽減	落花後または袋かけ後より3回
カキ	硬度・日持ち向上	落花後より収穫まで定期的3～5回
モモ	硬度・日持ち向上	落花後より収穫まで定期的3～5回
オウトウ	日持ち向上・うるみ果軽減 花カス除去	満開15日後より2～3回
ナシ	石ナシ軽減・Ca欠予防	落花直後より3～5回
その他果樹全般	カルシウム欠乏予防	症状の出る時期までに予防的1～3回程度散布(目安)
野菜全般	カルシウム欠乏予防	症状の出る時期までに予防的1～3回程度散布(目安)

◇散布のポイント◇

Ca欠乏症は出てしまったものは回復しません。また、根からの吸収では土壌環境や根の状態に影響を受けやすく、土壌にカルシウムが充分あっても欠乏症の出るケースは多く見られます。予防的かつこまめな散布がおすすめです。

◇使用上の注意◇

高温時の散布は避けて下さい。

りん酸を含有する薬剤と混用すると、タンク内で結合し、沈殿することがあります。



製造元 晃栄化学工業株式会社 <Koei Chemical>

本社 〒460-0003

名古屋市中区錦1-7-34 ステージ錦 I

TEL (052) 211-4451

札幌営業所 TEL: 011-707-4531

弘前営業所 TEL: 0172-27-1768

東京営業所 TEL: 03-3863-6131

松本営業所 TEL: 0263-32-4441

熊本営業所 TEL: 096-365-2081