

カルシウム高含有！欠乏対策に効果的

特殊肥料

葉 面 散 布

スイカル®

有機酸カルシウム(CaO)42.0%以上



1kg×20袋 箱詰
5kg×4袋 箱詰

野菜版
チラシ

- カルシウムの含有量が高く、効率的かつ経済的！
- 無色透明に溶け、作物を汚しません。
- 溶けがよく、吸収のよい有機酸カルシウムを使用。

使用倍率：葉面散布500～1000倍 (肥料登録の為、作物・倍数・回数の制限はありません)

対象作物	散布目的	散布時期
トマト	チャック・窓あき	育苗時・・・2回（1～2段に症状多い場合のみ） 定植後・・・各段開花前後に定期的散布
	尻腐れ予防	
ミニトマト	芯どまり・裂果予防	
ピーマン・シシトウ	尻腐れ予防	
キュウリ	落下傘葉軽減	
ナス	尻腐れ・日焼け果予防	交配後 3～4回散布
スイカ・メロン	発酵果予防・日持ち向上	
イチゴ	チップバーン・軟化予防	定植後 定期的散布
	日持ち性向上	
キャベツ・白菜・レタス	芯腐れ・縁腐れ予防	定植後 3～4回 定期的散布
ハウレンソウ	日持ち性向上	本葉2枚展開時と4枚展開時の2回
タマネギ	芯腐れ予防	定植後随時（夏期・長雨前後など）
ネギ	葉先枯れ予防	定植後 定期的散布
ブロッコリー	花蕾腐敗予防	花蕾形成期頃より3回
その他野菜全般	カルシウム欠乏予防	症状の出る時期までに予防的1～3回程度散布（目安）
花き類	葉先枯れ予防・茎葉等細胞強化	症状の出る時期までに予防的1～3回程度散布（目安）
果樹全般	カルシウム欠乏予防	症状の出る時期までに予防的1～3回程度散布（目安）

◇散布のポイント◇

Ca欠乏症は出てしまったものは回復しません。また、根からの吸収では土壌環境や根の状態に影響を受けやすく、土壌にカルシウムが充分あっても欠乏症の出るケースは多く見られます。予防的かつこまめな散布がおすすめです。

◇使用上の注意◇

高温時の散布は避けて下さい。

りん酸を含有する薬剤と混用すると、タンク内で結合し、沈殿することがあります。



製造元 晃栄化学工業株式会社 (Koei Chemical)

本社 〒460-0003

名古屋市中区錦1-7-34 ステージ錦I

TEL (052) 211-4451

札幌営業所 TEL: 011-707-4531

弘前営業所 TEL: 0172-27-1768

東京営業所 TEL: 03-3863-6131

松本営業所 TEL: 0263-32-4441

熊本営業所 TEL: 096-365-2081