

カルシウム欠乏対策に（使い易い液体タイプ）

特殊肥料

液体ハイカルック®

有機酸カルシウム10.0%以上



1.1kg×12本タイプ
10kgテナータイプ

総合
チラシ

カルシウムの補給により、様々な生理障害の防止・軽減を図ります。

◇使用方法◇ **500倍～1000倍**で葉面散布（肥料登録の為、作物・倍数・回数制限はありません）

対象作物	散布目的	散布時期	
トマト	チャック・窓あき	育苗時・・2回（1～2段に症状多い場合のみ） 定植後・・各段開花前後に定期的散布	
	尻腐れ・芯どまり予防		
ミニトマト	芯どまり・裂果予防		
ピーマン	尻腐れ予防		
キュウリ	落下傘葉・くくれ果軽減		
ナス	尻腐れ・Ca欠予防		
スイカ・メロン	発酵果予防・日持ち向上		交配後 2～3回散布
イチゴ	チップバーン・軟化予防		定植後 定期的散布
	日持ち性向上		
キャベツ・白菜・レタス	芯腐れ・縁腐れ予防		定植後 3～4回 定期的散布
ハウレンソウ	日持ち性向上	本葉2枚展開時と4枚展開時の2回	
大根	赤心・サメ肌・芯腐れ予防	播種後20日 30日 40日の3回	
タマネギ	芯腐れ予防	定植後随時（夏期・長雨前後など）	
ネギ	葉先枯れ予防	定植後 定期的散布	
セルリー	芯腐れ予防	定植後 定期的散布	
ブロッコリー	空洞軽減・花蕾腐敗予防	花蕾形成期頃より3回	
その他野菜全般	カルシウム欠乏予防	症状の出る時期までに予防的1～3回程度散布（目安）	
花き類	葉先枯れ予防・莖葉等細胞強化	症状の出る時期までに予防的1～3回程度散布（目安）	
果樹全般	カルシウム欠乏予防	症状の出る時期までに予防的1～3回程度散布（目安）	

Ca欠乏症は出てしまったものは回復しません。また根からの吸収では土壤環境と根の状態に影響を受け易く、土壤にCaが充分あっても欠乏症の出るケースは多くみられます。
予防的かつこまめな散布がおすすめです。

◇使用上の注意◇

りん酸を含有する薬剤と混用すると、タンク内で結合し、沈殿することがあります。

製造元 晃栄化学工業株式会社 [Koei Chemical](http://www.koei-chem.co.jp)

本社 〒460-0003

札幌営業所 TEL：011-707-4531

松本営業所 TEL：0263-32-4441

名古屋市中区錦1-7-34 ステージ錦I

弘前営業所 TEL：0172-27-1768

熊本営業所 TEL：096-365-2081

TEL (052) 211-4451

東京営業所 TEL：03-3863-6131