

トックスコア・マグ

®



1.25kg×12本タイプ
13kgテナー入りタイプ

保証成分 水溶性リン酸 : 28.0%
水溶性マグネシウム : 7.5%

【トックスコアの特長①】

亜リン酸肥料は、リン酸よりも分子量が小さい亜リン酸を主成分としており、一般のリン酸に比べ吸収性が高いため、以下の効果が得られます。

1. 亜リン酸と苦土で光合成能力アップ
2. 作物の健全生育・樹勢維持・養分の蓄積
3. 増収・増糖、歩留り向上、成熟の揃い



【トックスコアの特長②】

亜リン酸+苦土の2成分だけのタイプです。土壌診断結果で苦土・加里比の低い畑や堆肥の投入により加里が蓄積している畑では、慢性的に苦土不足の状態になり苦土やリン酸が吸収されにくい状態となっております。ぜひご活用ください。

◇適応作物◇ 作物全般 (肥料登録の為、作物・倍数・回数の制限はありません)

◇使用方法◇ 1000倍で葉面散布

対象作物	散布目的	散布時期・回数
育苗期の野菜全般	健苗育成、徒長防止、根はり促進	育苗初期から定植まで2~3回
アスパラガス	株養成、養分転流促進、増収	立茎後定期的に3回
ミツバ	株養成、養分転流促進、増収	生育盛期から2~3回
タマネギ	肥大促進	球肥大期から3回
トマト ミニトマト	着果、花芽分化促進、過繁茂 光合成促進、収穫期間延長	定植後10日毎散布
スイカ・メロン	糖度向上、肥大促進、苦土欠、つるぼけ防止	交配後10日おき2~3回
ピーマン・シシトウ	着果、花芽分化促進、過繁茂、収穫期間延長	定植後10日毎散布
イチゴ	過繁茂、成り疲れ、品質向上	定植後10日毎散布
バレイショ	増収、品質向上	着蕾期より7~10日毎3回
大豆・ソラ豆・豆類	増収、着莢数増加、品質向上、つるぼけ防止	開花始めから10日おき3回
甜菜	養分転流促進	生育盛期から2回

◇使用上の注意◇

高温時の散布は避けてください。

バイカルティ(Ca剤)との混用は可能です。別々に溶かしたものを混用して下さい。

本品は酸性の為、石灰硫黄合剤と混用すると有毒ガスを発生して危険ですので絶対に混用しないで下さい。

製造元 晃栄化学工業株式会社 <Koei Chemical>

本社 〒460-0003

名古屋市中区錦1-7-34 ステージ錦 I

TEL (052) 211-4451

札幌営業所 TEL: 011-707-4531 松本営業所 TEL: 0263-32-4441

弘前営業所 TEL: 0172-27-1768 熊本営業所 TEL: 096-365-2081

東京営業所 TEL: 03-3863-6131