

水稻の健全生育と食味向上に
環境保全型農業をサポートします

水溶性ケイ酸 28%
水溶性カリ 17%

液体ケイ酸カリ肥料

茎 葉 散 布

K S K 2 8®

水稻へのケイ酸の施用効果

ケイ酸の供給

形態的变化
・葉身が硬く直立する
・下葉の枯れが減る
生理的变化
・蒸散が抑制される
・水の利用率が上がる

病気に強くなる
不稔が出にくくなる
光合成能力が高まる

収量性の向上
タンパクの低下

澱粉が多く生産される
粳あたりのN減少

◇◆◇ 使用方法 ◇◆◇

幼穂形成期以降に 10アールあたり 0.7~1.4 kgを
1~2回散布して下さい。
水口施用の場合は 10アールあたり 1.4 kg

◇◆◇ 使用上の注意 ◇◆◇

- ◆本剤はアルカリ性です。高温時の散布は避けて下さい
- ◆他資材との混用は薬害などの有無を確認した上で使用して下さい。
- ◆本剤は、なるべくタンク内水量が多い時に、投入してください。

◇◆◇ 荷姿 ◇◆◇

1.4 kg×12本 ・ 4.2 kg×6個 ・ 14 kgテナータイプ

成熟期の稲体のケイ酸含有率(%) H.23

	沼田町 ゆめぴりか	北竜町 ゆめぴりか	雨竜町 きらら397
KSK28	6.6	6.2	7.5
無施用	5.3	5.8	6.6



製造元

晃栄化学工業株式会社



本社 〒460-0003

名古屋市中区錦1-7-34 ステージ錦I

TEL: 052-211-4451

札幌営業所 TEL: 011-707-4531

弘前営業所 TEL: 0172-27-1768

東京営業所 TEL: 03-3863-6131

松本営業所 TEL: 0263-32-4441

熊本営業所 TEL: 096-365-2081