

- 水分ストレスによる裂果・しおれの軽減
- 霜・低温から植物を保護
- 高温・乾燥時の保水力向上

凍結・乾燥
高温・低温

天然糖類トレハロース入り液肥

アイスバリア



1.1kg×12本
10kgテナー入り

®

◇保証成分◇ リン酸1.5% カリ1.0% マグネシウム1.5%

アイスバリアの特長

- 樹液濃度、樹体内水分の浸透圧を高める → 耐寒性強化
- 保水力に優れ、水分環境の変化に対応 → 裂果・しおれ軽減
- 被膜性に優れ、コーティング効果 → 保護作用
- 動植物の生体内にも存在する天然糖質 → 安全・安心
(キノコ、ビール、パンなどに含有)

◇使用方法◇ 葉面散布でご使用ください。(肥料登録のため、作物・倍数・回数制限はありません)

対象作物	散布目的	散布時期	回数	倍数
果樹全般	霜、低温	霜、低温の直前 芽出し10日後から(防除混用可能)	2~3回	100~ 333
野菜全般	霜、低温	定植期以降 (低温の場合は2~3日に1回)		333~ 500
アスパラガス	霜、低温	萌芽以降	2~3回	500
花き	霜、低温 アントシアニンによる花、葉の変色軽減	定植期以降(低温の場合2~3日に1回) 秋の低温時	2~3回	500
オウトウ・ブルー	裂果・しぼみ軽減、糖度向上、鮮度保持	着色始め~収穫まで10日前	2~3回	500
トマト	裂果・しおれ軽減、低温障害軽減	各段ごとに着果~収穫まで10日毎	4~5回	500
ミニトマト	裂果・しおれ・ヘタ落ち・カール軽減 糖度向上、鮮度保持	各段ごとに着果~収穫まで10日毎	4~5回	500
ピーマン	赤果・黒アザ果・横ヒビ軽減	各段ごとに着果~収穫まで10日毎	4~5回	500
スイカ・メロン	しおれ軽減	収穫期前から	2~3回	500
キュウリ	芯ヤケ	(梅雨明け直後、曇天から快晴時)		

- ◇使用上の注意◇
- ・作物によって低温障害の限界温度が異なり、またその遭遇時間によっては効果が十分に発揮されない場合があります。
 - ・浮遊物・沈殿・変色をおこすことがあります。品質・効果には影響ありません。
 - ・防霜ファン、燃料資材と併用するとより効果的です。

葉 面 散 布

霜が来なくても栄養補給!

アイスバリアにはリン酸、カリ、マグネシウムが配合されています。これらの肥料成分により、葉色向上、光合成増進の効果があります。

製造元 晃栄化学工業株式会社 (Koei Chemical)

本社 〒460-0003

名古屋市中区錦1-7-34 ステージ錦 I

TEL (052) 211-4451

札幌営業所 TEL: 011-707-4531 松本営業所 TEL: 0263-32-4441

弘前営業所 TEL: 0172-27-1768 熊本営業所 TEL: 096-365-2081

東京営業所 TEL: 03-3863-6131