


<花き 葉面散布肥料使用例>

※散布量は農薬に準ずる

品種 使用時期	トルコ	リンドウ (2年目以降)	ストック	小菊
育苗期	【アイスバリア】 ・凍霜害対策 500倍×2~3回 		【アイスバリア】 ・凍霜害対策 500倍×2~3回 	【アイスバリア】 ・凍霜害対策 500倍×2~3回 
定植期 以降	【液体ハイカルック】 ・葉先枯れ対策 500倍 	<かん水の場合> 1000倍 単用施用 ※リン酸含む液肥と混用不可		
	【エイトビー】 ・茎割れ対策 ・茎折れ対策 1.000倍×5回 予防散布の場合：2000倍 	【トックスコア・リン】 ・開花前進 1.000倍×3~4回 	【エイトビー】 ・茎割れ対策 ・茎折れ対策 1.000倍×5回 	【アイスバリア】 ・高温時の奇形花 ・花卉のアントシアニン軽減 (秋季) 500倍×2~3回 
収穫期 以降		【トックスコア・リン】 ・貯蔵養分増進 ・株の充実 1.000倍×3~4回 		

備考	【トックスコア・リン】 花芽分化促進、開花前進、着花促進、葉色向上、徒長抑制、株の充実 (リンドウ等) 
----	---

